



Checkliste Besamungstauglichkeit

	Die Kuh ist besamungstauglich	Die Kuh ist nur bedingt besamungstauglich	Die Kuh ist nicht besamungstauglich
	 Wenn sie ...	 Wenn sie ...	 Wenn sie ...
Vorgeschichte	... gesund ist.	... krank war.	akut erkrankt ist und z. B. Fieber hat.
	... eine problemlose Geburt und Nachgeburtsphase hatte.	... eine Schweregeburt oder eine gestörte Nachgeburtsphase hatte.	
	... vor mehr als 50 Tagen kalbte.	... vor weniger als 50 Tagen kalbte.	
Beobachtete Brunst	... vor 12 bis 24 Stunden zum ersten Mal «stand».	... vor weniger als 12 oder mehr als 24 Stunden zum ersten Mal «stand».	... vor mehr als 36 Stunden zum ersten Mal «stand».
	... deutlich in Brunst ist.	... nur unsichere Brunstzeichen zeigt.	
	... glasklaren, fadenziehenden Brunstschleim hat.	... rauchigen Brunstschleim hat: Besamung mit Überzugshülle.	... deutlich eitrigem Ausfluss oder blutigem Schleim hat.
Untersuchung von aussen		... mager ist (BCS < 2.5).	
		... Klauenprobleme hat.	
		... ein stark gestelltes Becken, einen eingefallenen Mastdarm hat oder ihre Schamlippen einen schlechten Schluss haben (Luft einziehen in die Scheide).	
			... eingefallene Beckenbänder hat (wegen Zysten auf den Eierstöcken).
Untersuchung durch die Besamerin/ den Besamer	... eine gut rückgebildete Gebärmutter hat (unter der Hand versammelbar und symmetrisch).		... eine grosse, deutlich asymmetrische Gebärmutter hat: Sie ist nicht sauber; Sie ist bereits tragend.
		... eine leichte Senkscheide hat.	... eine starke Senkscheide hat: ihr Muttermund liegt im Urinsee.